Nombre:

Tamaño: ☐ GRANDE ☐ MEDIANA ☐ CHICA

Características: ....

....

....

....

....

....

....

....

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Nombre:

Tamaño: ☐ GRANDE ☐ MEDIANA ☐ CHICA

Características: ....

....

....

....

....

....

....

....

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

FICHAS TÉCNICAS

AVISTAJE DE AVES DE RESERVAS NATURALES

OLAVARRÍA
MUNICIPIO

CALANDRIA GRANDE

Mimus saturninus

TAMAÑO MEDIANO

Tiene un canto melodioso. Puede imitar el sonido de otras aves y mamíferos, e inclusive el silbido humano.

Pasa la mayor parte del tiempo en el suelo donde realiza cortas y rápidas carreras, en general con las plumas de la cola elevada. Se alimenta de insectos y frutos, y son muy territoriales.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Nombre:

Tamaño: ☐ GRANDE ☐ MEDIANA ☐ CHICA

Características: ....

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

SUIRIRÍ REAL

Tyrannus melancholicus

TAMAÑO PEQUEÑO

Defiende activamente su territorio y persigue aves de mayor tamaño que se acercan al nido.

Es un pequeño atrapamoscas de ojos claros y ceja blanca conspicua. Captura insectos mediante vuelos cortos desde perchas expuestas y frecuenta bordes de parques y arboledas.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Nombre:

Tamaño: ☐ GRANDE ☐ MEDIANA ☐ CHICA

Características: ....

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Nombre:

Tamaño: ☐ GRANDE ☐ MEDIANA ☐ CHICA

Características:

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

CHIMANGO

Milvago chimango

TAMAÑO GRANDE

Es cazador y carroñero. Sus presas suelen ser pequeñas, desde insectos hasta roedores y peces.

Posee un plumaje parduzco y moteado con manchas claras. Garganta, pecho, abdomen, vientre y zona cloacal más claras.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Nombre:

Tamaño: ☐ GRANDE ☐ MEDIANA ☐ CHICA

Características:

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5



HORNERO

Furnarius Rufus

TAMAÑO MEDIANO

Se lo llama “hornero” debido a que su nido tiene una forma similar a un horno de barro.

Es el ave nacional de Argentina. Camina con elegancia. Es un ave insectívora que consigue su alimento mientras camina por el suelo.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

TORDO RENEGRIDO

Molothrus bonariensis

TAMAÑO MEDIANO

Los tordos no construyen nidos, depositan sus huevos en los de otras muchas especies (parasitismo de puesta).

En ocasiones destruyen los huevos de sus anfitriones de nido después de haber puesto los suyos. De esta forma los pichones de tordo nacen y son criados por las aves que hicieron el nido, creyendo que son sus crías.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

CARANCHO

Caracara plancus

TAMAÑO GRANDE

La piel de la cara es desnuda, rasgo típico de las aves carroñeras.

Es un ave oportunista, con frecuencia se le puede observar comiendo animales muertos. Pueden hacer caza cooperativa para predar sobre aves de mayor tamaño.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5



ZORZAL COLORADO

Turdus rufiventris

TAMAÑO MEDIANO

Hacia fines del invierno empieza a cantar antes del amanecer. Se escuchan claramente en el silencio matinal.

Cuando camina por el suelo, se dedica a hurgar entre los mantillos orgánicos en busca de lombrices que son de su especial predilección, entre otros.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

COTORRA

Myiopsitta monachus

TAMAÑO MEDIANO

Son aves amistosas y muy adaptables, caracterizadas por ser grandes BULLICIOSAS.

Tienen un plumaje de color verde azulado, amarillo y blanco que cubre todo el cuerpo, diferenciándose los ejemplares más jóvenes por tener el pecho y los ojos grises.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5



RATONA COMÚN

Troglodytes aedon

TAMAÑO PEQUEÑO

A pesar de su diminuto tamaño, emite cantos potentes y sorprendentemente complejos y prolongados.

Utiliza cavidades naturales o artificiales para reproducirse y mantiene la cola frecuentemente erguida mientras explora activamente la vegetación en busca de presas.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5



TIJERETA

Tyrannus savana

TAMAÑO MEDIANO

Su cola puede medir hasta el doble de su cuerpo y es usada para atraer pareja.

La Tijereta se alimenta principalmente de insectos capturados en vuelo y realiza migraciones estacionales entre el sur de América del Sur y regiones más tropicales.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

CARPINTERO REAL

Colaptes melanochloros

TAMAÑO MEDIANO

Son trepadores y se alimentan de larvas e insectos. Toman el alimento perforando los troncos de los árboles con su largo pico.

Sus patas tienen dos largos dedos, dos hacia delante y dos hacia atrás, que, junto con las largas uñas terminadas en gancho, le permiten trepar por los troncos. Se puede observar en muchos parques de ciudades.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

PIRINCHO

Guira guira

TAMAÑO GRANDE

Frecuentemente toma baños de sol grupales, extendiendo las alas para regular su temperatura corporal.

De hábitos marcadamente sociales.
Forma bandadas estables y realiza nidificación comunal: varias hembras pueden depositar sus huevos en un mismo nido y participar en la crianza colectiva.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

GOLONDRINA TIJERITA

Hirundo rustica

TAMAÑO PEQUEÑO

Recorre miles de kilómetros durante sus migraciones, uniendo continentes mediante impresionantes viajes estacionales.

Cumple un rol clave como controladora biológica natural: una sola pareja puede consumir miles de insectos por día, regulando poblaciones de insectos que afectan a los cultivos.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

TERO

Vanellus chilensis

TAMAÑO MEDIANO

Centinela. Agresivo defendiendo sus huevos o polluelos. Un adulto se mantiene alerta en el suelo y el otro en el aire.

Posee una vocalización estridente y vibrante. Para cazar hacen una pequeña carrera de dos o tres pasos, se detienen y lanzan un picotazo hacia adelante.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

CHURRINCHE

Pyrocephalus rubinus

TAMAÑO PEQUEÑO

El macho realiza vistosos vuelos de exhibición, mostrando su intenso plumaje rojo para atraer parejas.

Presenta una elevada agudeza visual que le permite detectar presas en movimiento a distancia. Establece territorios reproductivos y muestra gran fidelidad a sus sitios de nidificación.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

VERDÓN

Embernagra platensis

TAMAÑO MEDIANO

Construye nidos esféricos entre juncos y pastizales, donde oculta cuidadosamente sus huevos claros.

Es un ave paseriforme que realiza desplazamientos locales según la disponibilidad de agua y alimento, ocupando territorios de reproducción durante la primavera y el verano.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

PECHO AMARILLO COMÚN

Pseudoleistes virescens

TAMAÑO MEDIANO

Suele reunirse en grupos numerosos y utiliza postes o arbustos elevados como miradores de vigilancia.

Pecho amarillo intenso y patas largas. Explora el suelo en busca de invertebrados y pequeños frutos, reproduciéndose en nidos construidos entre vegetación densa y húmeda.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

GORRIÓN

Passer domesticus

TAMAÑO PEQUEÑO

Podrás verlo en el suelo, dando saltos con mucha rapidez.

Se alimenta de semillas, pero puede utilizar restos de nuestra comida. Los machos se distinguen por una “corbatita negra” que cubre el pecho y la garganta.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

BENTEVEO COMÚN

Pitangus sulphuratus

TAMAÑO MEDIANO

Se interpreta su grito clásico y chillón con diferentes significados, y de allí su variabilidad de nombres comunes.

Notable antifaz negro con ceja y garganta blanca, de vientre amarillo. Fuerte pico y patas de color negro.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

TORDO MÚSICO

Agelaioides badius

TAMAÑO MEDIANO

Con frecuencia aprovecha nidos abandonados de otras especies en lugar de construir los propios.

Posee plumaje gris parduzco y ojos claros muy llamativos. Mantiene conductas cooperativas y consume una dieta variada compuesta por insectos, semillas y pequeños vertebrados.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

CHINGOLO

Zonotrichia capensis

TAMAÑO MEDIANO

Es un ave solitaria. Confiado. Habita una gran variedad de entornos naturales.

Pasa mucho tiempo en árboles y arbustos, aunque baja a tierra a recoger su principal alimento, semillas y gusanos. La garganta es blanca, con un visible collar en la nuca de color castaño rojizo.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5



PICAFLOR GARGANTA BLANCA

Leucochloris albicollis

TAMAÑO PEQUEÑO

Puede permanecer suspendido en el aire mientras introduce su largo pico dentro de flores profundas.

Los machos suelen establecer áreas de alimentación que defienden de otros colibríes mediante rápidos vuelos de persecución. Su tamaño y agilidad les permiten explorar flores de diversas formas y alturas.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5



TORCAZA

Zenaida auriculata

TAMAÑO MEDIANO

Generalmente se quedan inmóviles, mirando fijamente hacia el lugar que disparó la alerta,

Es una ave gregaria y veloz, que se ha adaptado muy bien a las áreas urbanas. En el cuello se puede observar una mancha iridiscente color vino. El macho canta con más fuerza y entonación que la hembra.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

CABECITANEGRA COMÚN

Spinus magellanicus

TAMAÑO PEQUEÑO

Es capaz de colgarse boca abajo de ramas delgadas para alcanzar semillas difíciles de obtener.

Posee un aparato digestivo especializado para procesar semillas pequeñas y duras. Durante la muda anual renueva completamente su plumaje, manteniendo la capacidad de explotar distintos ambientes.

☐ OBSERVADA ☐ OIDA

CANTIDAD DE EJEMPLARES OBSERVADAS ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HORARIO ☐ MAÑANA ☐ MEDIODIA ☐ TARDE ☐ VESPERTINO

GRADO DE DIFICULTAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5